

PREAMBULE

Cette information sur les médicaments
« à utiliser avec précaution » en cas de myasthénie
provient de sources reconnues,
dont le Vidal et la carte de soins et d'urgence
du Ministère de la Santé avec le concours de l'AFM.

Le patient doit présenter ce document à chaque
consultation, prescription ou délivrance.
Il aide les soignants à sécuriser la prise en charge,
sans remplacer leur jugement clinique

Deux notices sont proposées selon le mode de classement.



NOTICE I

Regroupée par spécialités médicales
et par types de médicaments
La DCI (Dénomination Commune Internationale)
a été retenue.



NOTICE II

Liste alphabétique par principe actif
Classement des DCI
pour un repérage rapide



ATTENTION

Bien que ces listes soient très complètes,
elles ne prétendent pas être exhaustives
ni se substituer à l'avis de spécialistes.



Document Bilingue

Un document bilingue, adapté aux situations d'urgence,
est disponible via le forum de l'association.

Format « poche » 10 × 12 cm, pratique à emporter
en déplacement ou en voyage.



Association des Myasthéniques
Isolés et Solidaires
Membre d'Euro Myasthenia
Gravis Association

Web : www.myasthenie.fr
Forum : www.myasthenie.com
Youtube : @AssociationAMIS
Mail : association.amis@myasthenie.com

Pour obtenir la dernière mise à jour
connectez-vous sur

www.myasthenie.com/medicaments

ou en scannant le QR code



INFORMATION
Médicaments à utiliser
avec précaution par
les myasthéniques



NOTICE 1

Regroupée par spécialités médicales et
par types de médicaments



Version 3.0.0.b 05/2026



Liste alphabétique par famille thérapeutique



Anesthésie & Réa	Halofantrine	Pravastatine	Alprazolam	Hydroquinidine	Pindolol	Mépyramine maléate	Oxybutynine
Alcuronium	Hydroxychloroquine	Quinidine	Aténolol	Hydroxyzine	Pizotifène	Tényldiamine	Oxydipentonium
Alfentanil	Isépacrine	Rosuvastatine	Baclofène	Lévomépromazine	Prazépam	Thiazinamium	Solifenacine
Atracurium	Kanamycine	Simvastatine	Bétatop Gé	Lidocaïne IV	Prométhazine	Produits de contraste	
Cisatracurium	Levofloxacine	Divers ou Autres	Bromazépam	Lithium	Propafénone	Buzépide métiodure	
Diméthyltubocurinium	Lincomycine	Nicotine (patch)	Bromphéniramine	Loflazépate d'éthyle	Propranolol	Dipyridamole injectable	
Kétamine	Méfloquine	Patchs nicotiniques	Carbamazépine	Loprazolam	Témazépam	Etipirium iodure	
Mivacurium	Moxifloxacine	Gastro & Transit	Chlordiazépoxide	Lorazépam	Tétrazépam	Gadopentétate de méglumine	
Monoxyde d'azote	Néomycine	Adiphéline	Chlorphénamine	Méclozine	Vérapamil	Gallamine triiodoéthylate	
Phénobarbital	Nétilmicine	Buclizine	Chlorpromazine	Méphénésine	Zolpidem	Iode injectable	
Procaïne	Ofloxacine	Camyloline	Cinnarizine	Méquitazine	Zopiclone	Psychiatrie & Sommeil	
Rocuronium	Pefloxacine	Cyclizine	Clidinium	Méthocarbamol	Nutrition & Alimentation	Brotizolam	
Sévoflurane	Polymyxine	Magnésium IV	Clobazam	Métoprolol	Schweppes & Tonics	Chlormézanone	
Suxaméthonium	Quinine	Magnésium per os	Clonazépam	Midazolam	Ophthalmologie	Chlorproéthazine	
Thiopental	Quinquina	Oxyphencyclimine	Clorazépate	Nadolol	Bétaxolol	Cloxacolam	
Vécuronium	Rolitétracycline	Pentapipéride fumarate	Clotiazépam	Nifédipine	Cartéolol	Fencarbamide napadisilate	
Antibiotiques	Telithromycine	Pidolate de Mg	Dantrolène	Nitrazépam	Timolol	Kétazolam	
Azithromycine	Tétracycline	Immunologie	Diazépam	Nordazépam	ORL & Déglutition	Methdilazine	
Chloroquine	Tigécycline	Corticoides	Diltiazem	Octatropine méthylbromure	Azatadine dimaléate	Propyromazine bromure	
Ciprofloxacine	Tiopronine	Interférons alfa-2a/2b	Diphénhydramine	Oxatomide	Carbinoxamine maléate	Prozapine	
Clarithromycine	Tobramycine	Thiocolchicoside	Dipyridamole	Oxazépam	Chlorphenoxamine	Rhumathologie	
Clindamycine	Cardiologie	Vaccins vivants	Doxylamine	Oxoméazine	Clémastine fumarate	Carisoprodol	
Colistine	Atorvastatine	Viraféronpeg	Estazolam	Oxprénolol	Dexchlorphéniramine	Idrocilamide	
Dibékacin	Fluvastatine	Neurologie	Etifoxine	Phéniramine	Histapyrodine	Orphénadrine	
D-pénicillinaïne	Lovastatine	Acébutolol	Flunitrazépam	Phényltolexamine	Isothipendyl	Urologie & Autonomie	
Gentamicine	Pitavastatine	Alimémazine	Fluphénazine	Phénytoïne	Méfénidramium	Dipiprovérine	

Il est vivement recommandé de présenter ce document à tout médecin (généraliste, spécialiste, dentiste...) ainsi qu'aux autres soignants susceptibles d'administrer ou de conseiller un traitement, comme les infirmiers, kinésithérapeutes ou sages-femmes.

La même recommandation s'applique à tout pharmacien, consultant un patient en automédication, ou à des fins de vérification en cas de doute.

Seul le médecin est apte à juger du bien-fondé de l'usage d'un médicament et à évaluer le rapport bénéfices/risques d'une thérapie.

Document réalisé par l'Association AMIS - www.myasthenie.fr - version 3.0.0.b NV - Ce document ne se substitue pas à un avis médical.

