

PREAMBULE

Cette information sur les médicaments
« à utiliser avec précaution » en cas de myasthénie
provient de sources reconnues,
dont le Vidal et la carte de soins et d'urgence
du Ministère de la Santé avec le concours de l'AFM.

Le patient doit présenter ce document à chaque
consultation, prescription ou délivrance.
Il aide les soignants à sécuriser la prise en charge,
sans remplacer leur jugement clinique

Deux notices sont proposées selon le mode de classement.



NOTICE I

Regroupée par spécialités médicales
et par types de médicaments
La DCI (Dénomination Commune Internationale)
a été retenue.



NOTICE II

Liste alphabétique par principe actif
Classement des DCI
pour un repérage rapide



ATTENTION

Bien que ces listes soient très complètes,
elles ne prétendent pas être exhaustives
ni se substituer à l'avis de spécialistes.



Document Bilingue

Un document bilingue, adapté aux situations d'urgence,
est disponible via le forum de l'association.

Format « poche » 10 × 12 cm, pratique à emporter
en déplacement ou en voyage.



Association des Myasthéniques
Isolés et Solidaires
Membre d'Euro Myasthenia
Gravis Association

Web : www.myasthenie.fr
Forum : www.myasthenie.com
Youtube : @AssociationAMIS
Mail : association.amis@myasthenie.com

Pour obtenir la dernière mise à jour
connectez-vous sur

www.myasthenie.com/medicaments

ou en scannant le QR code



INFORMATION
Médicaments à utiliser
avec précaution par
les myasthéniques



NOTICE II

Liste alphabétique par
principe actif



Version 3.0.0.b 05/2026



Principes actifs de spécialités délivrées en pharmacie

Les principes actifs délivrés en pharmacie et formellement contre-indiqués sont en caractères gras surlignés, les autres sont à utiliser avec précaution.



Usage principalement hospitalier et rétrocession



Acébutolol	Clindamycine	Hydroxychloroquine	Midazolam	Pidolate de Mg	Thiocolchicoside	Adiphénine	Fencarbamide napadisilate	Thiopental
Alfentanil	Clobazam	Hydroxyzine	Mivacurium	Pindolol	Tigécycline	Alcuronium	Gadopentétate de méglumine	
Alimémarine	Clonazépam	Interférons alfa-2a/2b	Monoxyde d'azote	Pitavastatine	Timolol	Alfentanil	Gallamine triiodoéthylate	
Alprazolam	Clorazépate	Iode injectable	Moxifloxacine	Pizotifène	Tiopronine	Atracurium	Histapyrrodine	
Aténolol	Clotiazépam	Kanamycine	Nadolol	Polymyxine	Tobramycine	Azatadine dimaléate	Idrocilamide	
Atorvastatine	Colistine	Kétamine	Néomycine	Pravastatine	Vaccins vivants	Brotizolam	Isépamicine	
Atracurium	Corticoides	Levofloxacine	Nétilmicine	Prazépam	Vécuronium	Buclicine	Isothipendyl	
Azithromycine	Dantrolène	Lévomépromazine	Nicotine (patch)	Procaine	Vérapamil	Buzépide métiodure	Kétazolam	
Baclofène	Dexchlorphéniramine	Lidocaïne IV	Nifédipine	Prométhazine	Viraféronpeg	Camlyofine	Méfénidramium	
Bétatop Gé	Diazépam	Lincomycine	Nitrazépam	Propafénone	Zolpidem	Carbinoxamine maléate	Mépyramine maléate	
Bétaxolol	Diltiazem	Lithium	Nordazépam	Propranolol	Zoplicone	Carisoprodol	Methdilazine	
Bromazépam	Diphénhydramine	Loflazépate d'éthyle	Ofloxacine	Quinidine		Chlormézanone	Octatropine méthylbromure	
Bromphéniramine	Dipyridamole	Loprazolam	Oxatamide	Quinine		Chlorphenoxamine	Orphénadrine	
Carbamazépine	Doxylamine	Lorazépam	Oxazépam	Quinquina		Chlorproéthazine	Oxydipentonium	
Cartéolol	D-pénicillillamine	Lovastatine	Oxomémarine	Rocuronium		Cinnarizine	Oxyphencyclimine	
Chlordiazépoxyde	Estazolam	Magnésium IV	Oxprénolol	Rosuvastatine		Clémastine fumarate	Pentapipéride fumarate	
Chloroquine	Etifoxine	Magnésium per os	Oxybutynine	Schweppes & Tonics		Cloxacolam	Propyromazine bromure	
Chlorphénamine	Flunitrazépam	Méclozine	Patchs nicotiniques	Sévoflurane		Cyclizine	Prozapine	
Chlorpromazine	Fluphénazine	Méfloquine	Pefloxacine	Simvastatine		Dibékacin	Rolitétracycline	
Ciprofloxacine	Fluvastatine	Méphénésine	Phéniramine	Solifenacine		Diméthyltubocurinium	Suxaméthonium	
Cisatracurium	Gentamicine	Méquitazine	Phénobarbital	Telithromycine		Dipiprovérine	Tényldiamine	
Clarithromycine	Halofantrine	Méthocarbamol	Phényltolexamine	Témazépam		Dipyridamole injectable	Tétracycline	
Clidinium	Hydroquinidine	Métoprolol	Phénytoïne	Tétrazépam		Etipirium iodure	Thiazinamium	

Il est vivement recommandé de présenter ce document à tout médecin (généraliste, spécialiste, dentiste...) ainsi qu'aux autres soignants susceptibles d'administrer ou de conseiller un traitement, comme les infirmiers, kinésithérapeutes ou sages-femmes.

La même recommandation s'applique à tout pharmacien, conseillant un patient en automédication, ou à des fins de vérification en cas de doute.

Seul le médecin est apte à juger du bien-fondé de l'usage d'un médicament et à évaluer le rapport bénéfices/risques d'une thérapie.

Document réalisé par l'Association AMIS - www.myasthenie.fr - version 3.0.0.b-NV - Ce document ne se substitue pas à un avis médical.

